

Rassenadvies Zaaiuien

2019



groei door kennis

Rassenkeuze Zaaiuien 2019

Uitzaaien van het juiste ras uien is een van de eerste stappen naar het behalen van een topopbrengst van hoge kwaliteit. De keuze van het juiste ras is van meerdere factoren afhankelijk:

- De grondsoort en structuur van uw percelen bepaalt mede het ras dat uitgezaaid kan worden. In de tabel met Agriant rassenadvies kan gekeken worden naar de kolom met de grondsoort die voor u van toepassing is. Voor elke grondsoort is er een geschikt ras beschikbaar.
- Houd ook rekening met het bouwplan, zo kan er een keuze worden gemaakt tussen een ras dat vroeger of later afrijpt. Dit kan zorgen voor een betere arbeidsverdeling.
- Kijk naar uw afzetmogelijkheden en houd bij uw keuze rekening met kwaliteit, opbrengst en de duur van de bewaarperiode.

Agriant rassenadvies gele uien 2019

		Bewaarperiode					
		Af land	Kort	Middellang		Lang	
Grondsoort		Licht		Middel	Zwaar	Middel	Zwaar
Oogsttijdstip	Vroeg	Barito Fasto Mika	Vento RS 1481 Hybing	SV 3557 ND Julia Hybound	Hypark	Centro	
	Midden		Sunskin Summit	Hytech	Hybelle Medaillon Saskia	Progression Motion Paradiso	Rockito Firmo
	Laat			Hystore	Donna	Hyway	Dormo Hoza

Agriant rassenadvies rode uien 2019

		Bewaarperiode					
		Af land	Kort	Middellang		Lang	
Grondsoort		Licht		Middel	Zwaar	Middel	Zwaar
Oogsttijdstip	Vroeg			Rolein			Kamal
	Midden						Red Tide Retano
	Laat			Red Baron			Romy

Raseigenschappen en opbrengsten van gele zaaiuienrassen

In onderstaande tabel zijn de eigenschappen van de gele zaaiuien weergegeven, onderbouwd door verzamelde gegevens uit een periode van 5 jaar (2012-2017)*. Houd bij de keuze van een ras rekening met de regio (zie rechts in de tabel).

Ras	Zaadhuis	Vroegheid	Vorm	Uniformiteit	Huid vastheidsindex	Hardheidsindex	Drogestofgehalte (relatie)	Eénkernigheidsindex	Spruitrust	Zuidwest 2012-2017	Flevoland 2012-2017
Julia	HoZ	8,6	1,9	2,0	96	88	99	77	6,2	94	92
SV 3557 ND	Sem	8,4	1,6	2,2	101	97	101	76	7,0	100	92
Hybound	G&S	8,2	1,7	2,2	100	96	102	80	6,8	100	103
Hypark	G&S	8,1	1,7	2,0	101	93	96	72	6,2	102	104
Novista	Tak	8,0	2,0	2,3	98	94	103	63	7,5	96	92
Centro	Haz	7,9	1,7	2,2	100	103	95	66	7,2	94	96
RS ₀₇₇₅ 1481	Sem	7,8	1,8	2,0	98	89	97	61	6,0	97	94
Rockito	Sem	7,5	1,6	2,1	102	110	100	80	6,7	99	100
Paradiso	Haz	7,3	1,8	2,3	101	110	104	70	7,0	97	101
Hybelle	G&S	7,3	1,7	2,3	97	98	95	80	6,2	108	110
Motion	Syn	7,0	1,9	2,2	102	110	99	81	7,3	98	101
Medaillon	Syn	7,2	1,8	2,2	101	96	101	75	7,1	101	102
Hytech	G&S	7,3	1,7	2,3	98	92	100	71	6,1	102	106
Firmo	Haz	7,0	1,8	2,1	101	110	103	68	7,3	98	96
Bingo	KBZ	6,6	1,9	1,9	98	92	101	49	5,9	95	94
Progression	Syn	6,4	1,7	2,3	102	115	104	82	8,0	96	97
Klondike 4400	KBZ	6,1	1,9	1,9	101	100	103	63	6,7	99	95
Donna	HoZ	6,4	1,9	2,0	101	97	98	81	6,3	109	108
Dormo	Haz	6,4	1,7	2,2	102	115	102	79	7,0	100	101
Delta Gigant	DSH	5,9	1,8	2,1	102	110	96	87	8,1	108	105
Hyfive	G&S	5,9	1,8	2,3	102	110	105	73	6,1	-	107
Hoza	HoZ	5,1	1,9	1,9	103	108	105	82	6,6	105	106
Hystore	G&S	5,6	1,7	2,2	100	97	95	77	7,3	103	-

100 = ...%, ton/ha

61,7 69,6

Kwaliteits- en opbrengstindex

In onderstaande grafiek zijn de rassen ingedeeld op basis van vroegheid- en kwaliteits-eigenschappen.



Bemestingsconcepten

Grondsoort	Klei				Tijdstip
Mest voorjaar	25-30 m ³ Varkensdrijfmest	Nee			
Pw getal	Alle	<25	25-50	>50	
		800 kg/ha Polysulphate	800 kg/ha Polysulphate	800 kg/ha Polysulphate	januari / februari
		350 kg/ha 26-14	350 kg/ha Exacote 29	350 kg/ha Exacote 29	voor zaaibed- bereiding
					zaaibedbereiding tot zaai
	30 l/ha Quickstart PK	30 l/ha Quickstart PK	30 l/ha Quickstart PK		bij het zaaien in de voor
		2 l/ha CropActiv aminoboost, 3-4 maal herhalen			Bij stress 1 ^e pijpje tot 10 cm
	100 kg/ha KAS + S				1 ^e overbemesting (1 ^e / 2 ^e pijpje)
	300 kg/ha 16-0-32	300 kg/ha 16-0-32	300 kg/ha 16-0-32	300 kg/ha 16-0-32	2 ^e overbemesting (bollen)

Grondsoort	Zand			Tijdstip
Mest voorjaar	20-25 m ³ Rundveedrijfmest		Nee	
Pw getal	25-50	>50	Alle	
				januari / februari
				voor zaaibed- bereiding
			185 kg/ha Exacote 29	zaaibedbereiding tot zaai
	30 l/ha Quickstart PK		30 l/ha Quickstart PK	bij het zaaien in de voor
		2 l/ha CropActiv aminoboost, 3-4 maal herhalen		Bij stress 1 ^e pijpje tot 10 cm
	150 kg KAS+S	150 kg/ha 16-0-32	300 kg/ha 16-0-32	1 ^e overbemesting (1 ^e / 2 ^e pijpje)
	300 kg 16-0-32	300 kg/ha 16-0-32	300 kg/ha 16-0-32	2 ^e overbemesting (bollen)

Tip:
gebruik 5x
5L Foliplus Kali
om het gewas
langer groen
te houden.

Zaaizaadhoeveelheid

	Gele uien	Rode uien
Optimale zaaidichtheid	80 planten/m ²	70 planten/m ²
Minder goede zaaiomstandigheden en/of late zaai	4,0 eenheden	3,4 eenheden
Ideale zaaiomstandigheden en/of vroege zaai	3,6 eenheden	3,2 eenheden
Standaard zaaiadvies	3,8 eenheden	3,3 eenheden
Zaaidiepte (afhankelijk van grondsoort, zaai-bed en weersomstandigheden)	1,5 - 3 cm	

Priming

Door uienzaad te primen wordt het kiemproces geactiveerd waardoor de zaden na het uitzaaien sneller en uniformer opkomen. Bij geprimed zaaizaad kan de zaaizaadhoeveelheid iets worden verlaagd.

Insectenbeheersing

In het verleden werd Mundial standaard toegepast als zaaizaadontsmetting. De opgebruikstermijn voor Mundial is 31 maart 2019. Dit betekent dat het zaaizaad ontsmet en uitgeleverd moet zijn voor deze datum. Na deze datum mag het nog wel worden gezaaid of gebruikt. Een goed alternatief hiervoor is Steriele Insecten Techniek (SIT). Deze techniek past uitstekend in een geïntegreerde teelt. Houd er rekening mee dat Mundial een nevenwerking had op andere (bodem)insecten, waaronder de bonenvlieg. Deze worden met SIT niet bestreden.

SIT

- Gesteriliseerde uienvliegen worden losgelaten in het veld
- Eitjes zijn onvruchtbaar en komen niet uit
- Wekelijkse beheersing in de maanden mei en juni

Bestellen

Bestellen kan telefonisch: 0591 64 22 22 of stuur een mail naar bestellingen@agriant.nl. Onze buitendienst kan u een deskundig advies geven bij het maken van de beste keuze.



T 0591 64 22 22  www.agriant.nl



groei door kennis